

Setmelanotide i drin gordewdra a hyperffagia yn syndrom Bardet-Biedl

22 Mai 2024

Mae setmelanotide (Imcivree) ar gael ar y GIG. Mae'n driniaeth bosibl ar gyfer gordewdra a hyperffagia yn syndrom Bardet-Biedl wedi'i gadarnhau yn enetig mewn pobl 6 blwydd oed neu hŷn, dim ond os ydynt rhwng 6 ac 17 oed pan fydd y driniaeth yn dechrau. Gall y bobl hyn barhau i gael setmelanotide fel oedolion nes bod angen iddynt stopio.

Os nad ydych yn gymwys i gael setmelanotide ond eich bod eisoes yn ei gael, dylech allu parhau nes y byddwch chi a'ch meddyg yn penderfynu ar yr adeg orau i roi'r gorau i'w gymryd.

A yw'r driniaeth hon yn addas i mi?

Dylai eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol roi gwybodaeth glir i chi, trafod eich opsiynau â chi a gwrando'n ofalus ar eich barn a'ch pryderon. Gall eich teulu fod yn rhan o'r broses hefyd, os byddwch yn dymuno. Gweler [ein tudalen we ar wneud penderfyniadau am eich gofal](#).

Cwestiynau i feddwl amdanynt

- Pa mor dda y mae'n gweithio o gymharu â thriniaethau eraill?
- Beth yw'r risgiau neu'r sgil-ffeithiau? Pa mor debygol ydynt?
- Sut y bydd y driniaeth yn effeithio ar fy mywyd o ddydd i ddydd?
- Beth fydd yn digwydd os na fydd y driniaeth yn gweithio?
- Beth fydd yn digwydd os na fyddaf am gael y driniaeth? A oes triniaethau eraill ar gael?

Gwybodaeth a chymorth

Gall [Bardet-Biedl Syndrome UK](#) (admin@bbsuk.org.uk) roi cyngor a chymorth i chi.

Gallwch hefyd gael cymorth gan eich tîm [Healthwatch](#) lleol.

Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.

© **NICE 2026**. All rights reserved. Subject to [Notice of rights](#).

ISBN: 978-1-4731-9299-7