

Tywysiad uwchsain i osod blaen nodwydd ger nerf i roi anesthetig a/neu boenladdwr

*Mae 'arweiniad
Techlechydd' NICE
yn rhoi cyngor i'r
GIG ar pryd a sut y
gellir defnyddio
triniaethau
llawfeddygol
newydd mewn arfer
clinigol.*

Mae'r daflen hon yn ymwneud â phryd a sut y gellir defnyddio tywysiad uwchsain yn y GIG i helpu i osod nodwydd ger nerf i roi anesthetig a/neu boenladdwr. Mae'n egluro'r canllawiau (cyngor) gan NICE (y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol).

Mae arweiniad Techlechydd yn gwneud argymhellion ar ddiogelwch triniaeth a pha mor dda y mae'n gweithio. Mae ymyriad yn brawf, triniaeth neu lawdriniaeth sy'n cynnwys torri neu wneud twll yn y croen, neu endosgop i edrych y tu mewn i'r corff, neu ffynonellau ynni fel pelydrau-X, gwres neu uwchsain. Nid yw'r canllawiau yn cynnwys p'un a ddylai'r GIG ariannu'r driniaeth ai peidio. Gwneir penderfyniadau ynglŷn ag arian gan gyrff lleol y GIG (ymddiriedolaethau gofal sylfaenol ac ymddiriedolaethau ysbyty) ar ôl ystyried pa mor dda y mae'r driniaeth yn gweithio a ph'un a yw'n werth am arian i'r GIG.

Ysgrifennwyd y daflen hon i helpu pobl y cynigiwyd y driniaeth hon iddynt fel y gallant benderfynu p'un a ddylent gytuno (cydsynio) iddi ai peidio. Nid yw'n disgrifio tywysiad uwchsain i osod nodwydd ger nerf yn fanwl - dylai aelod o'ch tîm gofal iechyd hefyd roi gwybodaeth lawn a chyngor i chi am hynny. Mae'r daflen yn cynnwys rhai cwestiynau y gallech fod am eu gofyn i'ch meddyg i'ch helpu i ddod i benderfyniad. Ceir rhai ffynonellau gwybodaeth a chymorth pellach ar dudalen 6.

Beth mae NICE wedi'i ddweud?

Gellir cynnig y driniaeth hon yn rheolaidd i bobl sydd angen anesthetig neu boenladdwr, yn ystod llawdriniaeth neu ar ei hôl, cyn belled â bod meddygon yn siŵr:

- bod y claf yn deall beth mae'n ei olygu a'i fod yn cytuno i gael y driniaeth, ac
- y caiff canlyniadau'r driniaeth eu monitro.

Mae NICE wedi dweud hefyd mai dim ond meddygon sydd â phrofiad o roi blociau nerfau lleol ac sydd wedi cael hyfforddiant mewn technegau tywys uwchsain ddylai gyflawni'r driniaeth.

Sylwadau eraill gan NICE

Dylai fod gan offer uwchsain ansawdd delwedd digonol.

Efallai nad hon yw'r unig ffordd bosibl o osod blaen nodwydd. Dylai eich tîm gofal iechyd siarad â chi ynghylch p'un a yw'n addas i chi a pha opsiynau triniaeth eraill sydd ar gael.

Tywysiad uwchsain i osod blaen nodwydd ger nerf i roi anesthetig a/neu boenladdwr

Yr enw meddygol ar y driniaeth hon yw 'bloc nerfau lleol a dywysir gan uwchsain'.

Ni chaiff y driniaeth ei disgrifio'n fanwl yma - siaradwch â'ch meddyg i gael disgrifiad llawn.

Mae angen chwistrellu anesthetig neu gyffuriau lleddfu poen i mewn i rai cleifion yn ystod llawdriniaeth neu ar ei hôl i atal poen mewn mannau penodol. Gellid hefyd defnyddio'r math hwn o bigiad i reoli poen cronig. Gelwir hyn yn bloc nerfau lleol oherwydd chwistrellir yr anesthetig neu'r cyffuriau lleddfu poen yn agos at y nerf yn y man y cynhelir y llawdriniaeth neu'n agos at y nerf sy'n trosglwyddo'r boen.

Gyda delweddu uwchsain, gall yr unigolyn sy'n cyflawni'r dasg (yr anesthetydd fel arfer) 'weld' y nerf. Mae hyn yn ei helpu i dywys blaen y nodwydd i'r man cywir a gwneud yn siwr bod yr anesthetig yn cyrraedd y man a dargedir.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Mae NICE wedi dweud bod y driniaeth hon yn ddigon diogel ac yn gweithio'n ddigon da i gael ei defnyddio yn y GIG. Os yw eich meddyg yn credu bod tywysiad uwchsain i helpu i osod blaen nodwydd ger nerf yn ddewis addas i chi, dylai sicrhau eich bod yn deall y manteision a'r risgiau o hyd cyn gofyn i chi gytuno i'r driniaeth.

Efallai y byddwch am ofyn y cwestiynau isod

- Beth yn union yw'r driniaeth hon?
- Beth yw'r manteision posibl?
- Beth yw'r tebygolrwydd y bydd y manteision hynny yn berthnasol i mi? A allai cael y driniaeth wneud i mi deimlo'n waeth?
- A oes triniaethau amgen?
- Beth yw risgiau'r driniaeth?
- A yw'r risgiau'n fach neu'n ddifrifol? Pa mor debygol ydyw y byddant yn digwydd?
- Pa ofal y bydd ei angen arnaf ar ôl y llawdriniaeth?
- Beth sy'n digwydd os aiff rhywbeth o'i le?
- Beth allai ddigwydd os na chaf y driniaeth?

*Gallech ddewis
cael y driniaeth
hon, cael triniaeth
wahanol, neu
beidio â chael
triniaeth o gwbl.*

Crynodeb o fanteision a risgiau posibl

Isod ceir disgrifiad bras o rai o'r manteision a'r risgiau a welwyd yn yr astudiaethau a ystyriwyd gan NICE. Edrychodd NICE ar 11 astudiaeth o'r driniaeth hon.

Pa mor dda y mae'r driniaeth yn gweithio?

Nododd dwy astudiaeth bod bloc nerfau yn fwy llwyddiannus gan ddefnyddio tywysiad uwchsain na heb uwchsain. Mewn astudiaeth o 188 o gleifion, roedd y gyfradd llwyddiant yn 83% ar gyfer tywysiad uwchsain a 63% hebddo. Mewn astudiaeth o 40 o gleifion, roedd bloc nerfau'n fwy llwyddiannus ac yn gyflymach mewn 20 o gleifion a driniwyd gyda thywysiad uwchsain o gymharu ag 20 a driniwyd hebddo. Roedd angen anesthetig cyffredinol ar un claf yn y grŵp tywysiad uwchsain a dau yn y grŵp hebddo. Nododd dwy astudiaeth arall bod bloc nerfau yn llwyddiannus mewn 99% allan o 1146 o gleifion ac mewn 94% allan o 520 o gleifion a driniwyd gyda thywysiad uwchsain.

Mewn astudiaeth o 60 o gleifion a gafodd lawdriniaeth, nid oedd bloc nerfau yn llwyddiannus mewn 1 allan o 20 o gleifion a driniwyd gan ddefnyddio tywysiad uwchsain ac mewn 2 allan o 20 o gleifion a driniwyd hebddo.

Nododd astudiaeth o 100 o gleifion fod angen llai o anesthetig i flocio'r nerfau pan ddefnyddiwyd tywysiad uwchsain. Roedd angen poen laddwyr ar lai o gleifion yn y grŵp tywysiad uwchsain (6%) nag yn y grŵp heb dywysiad uwchsain (40%) ar ôl llawdriniaeth.

Yn ogystal ag edrych ar yr astudiaethau hyn, gofynnodd NICE am farn cynghorwyr arbenigol hefyd. Mae'r cynghorwyr hyn yn arbenigwyr clinigol yn y maes hwn o feddyginiaeth. Dywedodd y cynghorwyr bod y ffactorau a ddefnyddir i asesu pa mor dda y mae'r driniaeth yn gweithio yn cynnwys pa mor llwyddiannus yw'r bloc nerfau, faint o anesthetig

sydd ei angen, pa mor gyflym y lliniarwyd poen y claf, difrifoldeb y boen, a sawl gwaith roedd angen gwrthio'r nodwydd i mewn.

Risgiau a phroblemau posibl

Y tri phrif gymhlethdod oedd teimlad yn debyg i 'binnau bach', twll mewn pibell waed ac anafiadau i'r nerf. Yn yr astudiaeth o 188 o gleifion, cafodd 13 allan o 64 o gleifion yn y grŵp uwchsain ac 13 allan o 64 o gleifion hebddo 'binnau bach', yn para hyd at 5 diwrnod. Nododd astudiaeth o 40 o gleifion fod gan nifer sylweddol fwy o bobl 'binnau bach' yn y grŵp heb uwchsain nag yn y grŵp uwchsain. Yn yr un astudiaeth, cafodd dim un o'r 20 o gleifion yn y grŵp uwchsain a 3 allan o 20 yn y grŵp hebddo dwll yn y bibell waed. Mewn astudiaeth arall o 60 o gleifion, cafodd dim un o'r 20 o gleifion yn y grŵp uwchsain a 4 allan o 40 o gleifion hebddo dwll yn y bibell waed, gan achosi cleisio. Cafodd dau allan o 620 o gleifion niwed i'r nerfau ar ôl cael cathetr (pibell denau) wedi'i osod gan ddefnyddio tywysiad uwchsain, ar gyfer trin poen barhaus. Diflannodd y symptomau ar ôl pythefnos mewn un claf ac ar ôl 6 wythnos yn y llall.

Yn ogystal ag edrych ar yr astudiaethau hyn, gofynnodd NICE am farn cynghorwyr arbenigol hefyd. Mae'r cynghorwyr hyn yn arbenigwyr clinigol yn y maes hwn o feddyginiaeth. Dywedodd y cynghorwyr y gallai problemau gynnwys niwed i organau, niwed i nerfau, gwallau chwistrellu, gwaedu a'r ysgyfaint yn ymgwmpo.

Rhagor o wybodaeth am leddfu poen ac anesthetig

Gall NHS Choices (www.nhsdirect.wales.nhs.uk) fod yn fan da i gael gwybod mwy. Efallai y gall eich gwasanaeth cyngor a chysylltiadau cleifion (a elwir yn PALS fel arfer) lleol roi cyngor a chymorth pellach i chi.

NICE

Mae NICE yn llunio canllawiau (cyngor) i'r GIG ynglŷn ag atal, canfod a thrin gwahanol gyflyrau meddygol. Ysgrifennir y canllawiau gan arbenigwyr annibynnol gan gynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a phobl sy'n cynrychioli cleifion a gofalwyr. Maent yn ystyried pa mor dda y mae ymyriad yn gweithio a pha mor ddiogel ydyw, ac yn gofyn barn cynghorwyr arbenigol. Mae'r arweiniad Techlechydd yn berthnasol i'r GIG cyfan yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Disgwylir i staff sy'n gweithio yn y GIG ddilyn y canllawiau hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am NICE, ei waith a sut mae'n gwneud penderfyniadau, ewch i www.nice.org.uk/aboutguidance

Mae'r daflen hon yn ymwneud â 'bloc nerfau lleol a dywysir gan uwchsain'. Mae'r daflen hon a'r canllawiau llawn a anelir at weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar gael ar www.nice.org.uk/HTG179

Gallwch archebu copïau wedi'u hargraffu o'r daflen hon o gyhoeddiadau NICE (ffoniwch 0845 003 7783 neu anfonwch neges e-bost i publications@nice.org.uk a dyfynnwch y cyfeirnod N1818).

Rydym yn annog sefydliadau'r sector gwirfoddol a sefydliadau'r GIG a chlinigwyr i ddefnyddio testun o'r llyfryn hwn yn eu gwybodaeth eu hunain am y driniaeth hon.

National Institute for Health and Clinical Excellence

MidCity Place, 71 High Holborn, London, WC1V 6NA; www.nice.org.uk

ISBN 978-1-4731-7862-5

N1818 1P Ion 09

© National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. All rights reserved. This material may be freely reproduced for educational and not-for-profit purposes. No reproduction by or for commercial organisations, or for commercial purposes, is allowed without the express written permission of NICE.