

# Ibrutinib ar gyfer lewchemia lymffosytig cronig a gafodd ei drin yn flaenorol a lewchemia lymffosytig cronig nas triniwyd, gyda dilead 17p neu fwtadiad TP53

25 Ionawr 2017

## Beth mae NICE wedi'i ddweud?

Argymhellir Ibrutinib (Imbruvica) fel triniaeth bosibl ar gyfer lewchemia lymffosytig cronig mewn oedolion:

- sydd wedi cael o leiaf 1 driniaeth o'r blaen
- sydd â dilead 17p neu fwtadiad TP53 ac nad yw imiwnotherapi-cemo yn addas.

## Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Os oes gennych lewchemia lymffosytig cronig a bod eich meddyg yn credu mai ibrutinib yw'r driniaeth gywir i chi, dylech allu ei chael ar y GIG.

## Y cyflwr a'r driniaeth

Mae lewchemia lymffosytig cronig yn ganser o fath o gell gwaed gwyn (a elwir yn lymffosytau B). Mae'r lymffosytau canseraidd yn llusosi mewn ffordd afreolus ac yn atal celloedd gwaed eraill rhag gweithio'n iawn. Bydd rhai pobl sydd â'r cyflwr yn profi newidiadau genetig (dilead 17p neu fwtadiad TP53) sy'n golygu eu bod yn llai tebygol o ymladd yn erbyn y canser.

Mae ibrutinib yn atal ensym ar arwyneb y celloedd canser, gan helpu i arafu twf y canser neu stopio'r canser rhag tyfu am gyfnod.

Gall [NHS Choices](#) fod yn fan da i gael gwybod mwy.

Gall y sefydliadau hyn roi cyngor a chymorth i chi:

- [GOFAL Lewchemia](#), 0808 8010 444

- [Bloodwise](#) (Ymchwil Lewcemia a Lymffoma yn flaenorol), 0207 504 2200
- [Cymdeithas Canser Lewcemia](#), 0208 374 4821
- [CLL Support Association](#), 0800 977 4396
- [Gwybodaeth i Gleifion Ymchwil Canser y DU](#), 0808 800 4040

Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.

ISBN: 978-1-4731-2364-9