

Asid obeticolig i drin colangitis fustlog cychwynnol

26 Ebrill 2017

Gwybodaeth i'r cyhoedd

Mae asid obeticolig (Ocaliva) ar gael ar y GIG fel triniaeth bosibl ar gyfer colangitis fustlog cychwynnol mewn oedolion:

- ar ei ben ei hun, os na ellir goddef asid ursodeoxycholic neu
- gydag asid ursodeoxycholic, os nad yw asid ursodeoxycholic ar ei ben ei hun wedi gweithio'n ddigon da.

Dylid rhoi'r gorau i driniaeth gydag asid obeticolig ar ôl 12 wythnos os nad yw'n gweithio'n ddigon da.

A yw'r driniaeth hon yn addas i mi?

Dylai eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol roi gwybodaeth glir i chi, trafod eich opsiynau â chi a gwrando'n ofalus ar eich barn a'ch pryderon. Gall eich teulu fod yn rhan o'r broses hefyd, os ydych yn dymuno. Gall gwybodaeth NICE ar [wneud penderfyniadau am eich gofal](#) hefyd eich helpu i benderfynu a ydych eisiau'r driniaeth.

Cwestiynau i feddwl amdanynt

- Pa mor dda y mae'n gweithio o gymharu â thriniaethau eraill?
- Beth yw'r risgiau neu'r sgîl-ffeithiau? Pa mor debygol ydynt?
- Sut y bydd y driniaeth yn effeithio ar fy mywyd o ddydd i ddydd?
- Beth fydd yn digwydd os na fydd y driniaeth yn gweithio?

- Beth fydd yn digwydd os nad wyf eisiau'r driniaeth? A oes triniaethau eraill ar gael?

Gwybodaeth a chymorth

Gall [NHS Choices](#) fod yn fan da i gael gwybod mwy.

Gall y sefydliadau hyn roi cyngor a chymorth i chi:

- [Ymddiriedolaeth Afu/lau Prydain](#), 0800 652 7330
- [Sefydliad Colangitis Fustlog Cychwynnol](#), 0131 556 6811
- [Liver4Life](#), 0800 074 3494

Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.

ISBN: 978-1-4731-2456-1