

Bisffosffonadau ar gyfer trin osteoporosis

18 Ebrill 2019

Mae'r bisffosffonadau asid alendronig, asid ibandronig, sodiwm risedronad ac asid soledronig ar gael ar y GIG fel triniaethau posibl ar gyfer pobl sy'n wynebu risg uwch o dorri asgwrn o ganlyniad i osteoporosis.

Os nad ydych yn gymwys i gael asid alendronig, asid ibandronig, sodiwm risedronad neu asid soledronig, ond rydych eisoes yn cymryd un ohonynt, dylech allu parhau nes y byddwch chi a'ch meddyg yn penderfynu ar yr adeg gywir i roi'r gorau i'w gymryd.

A yw'r driniaeth hon yn addas i mi?

Dylai eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol roi gwybodaeth glir i chi, trafod eich opsiynau â chi a gwranddo'n ofalus ar eich barn a'ch pryderon. Gall eich teulu fod yn rhan o'r broses hefyd, os ydych yn dymuno. Darllenwch ragor am [wneud penderfyniadau am eich gofal](#).

Cwestiynau i feddwl amdanynt

- Pa mor dda y mae'n gweithio o gymharu â thriniaethau eraill?
- Beth yw'r risgiau neu'r sgil-ffeithiau? Pa mor debygol ydynt?
- Sut y bydd y driniaeth yn effeithio ar fy mywyd o ddydd i ddydd?
- Beth fydd yn digwydd os na fydd y driniaeth yn gweithio?
- Beth fydd yn digwydd os nad wyf eisiau'r driniaeth? A oes triniaethau eraill ar gael?

Gwybodaeth a chymorth

Gall [NHS Choices](#) fod yn fan da i gael gwybod mwy.

Gall y sefydliadau hyn roi cyngor a chymorth i chi:

- [Y Gymdeithas Osteoporosis Genedlaethol](#), 0808 800 0035
- [Arthritis Research UK](#), 0800 5200 520
- [ARMA](#), 0203 856 1978

Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.

ISBN: 978-1-4731-2625-1